

LO SAPEVI
CHE....?

QUESTI CONIGLI SONO
AFFETTI DA UNA
MUTAZIONE GENETICA CHE
PROVOCA UNA FORMA DI
NANISMO CONGENITO

IL SUO CORPO È PICCOLO E DALLE FORME
ARROTONDATE. HA UN MANTO SOFFICE CHE A
SECONDA DELLA RAZZA PUÒ ESSERE A PELO
CORTO O LUNGO E DI DIVERSI COLORI.
È UN ANIMALE ESTREMAMENTE DELICATO E
NECESSITA DI CURE MOLTO SPECIFICHE.

CONIGLIO NANO

RICORDATE BENE...
IO NON SONO UN RODITORE!!

ORDINE
LEPORIDI
FAMIGLIA
LAGOMORFI
GENERE E SPECIE
ORYCTOLAGUS CUNICULUS



VI È L'ERRATA CONVINZIONE CHE IL PANE CONSUMI
I DENTI DEI CONIGLI
ANCHE SE QUESTO SEMBRA GRADIRLO, VA DETTO
CHE L'ALIMENTAZIONE RICCA DI PANE O
CARBOIDRATI IN GENERE PUÒ CAUSARE GRAVI
PROBLEMI.


L'APPARATO DIGERENTE DEL CONIGLIO NON È
IN GRADO DI ASSIMILARLI CORRETTAMENTE
E LA FERMENTAZIONE DI QUESTI PUÒ CAUSARE
METEORISMO E SUCCESSIVO BLOCCO
GASTRO INTESTINALE

DEVE ESSERE NUTRITO PREVALENTEMENTE CON
FIENO, CHE NON DEVE MAI MANCARE, E CIBI
FRESCHI COME VERDURE, ERBE DI CAMPO E FRUTTA
IL CONIGLIO, SIMILMENTE A MOLTI ALTRI
LAGOMORFI (MA VALE ANCHE PER ALCUNI
RODITORI), È PORTATO ANCHE A MANGIARE CARNE
O, ADDIRITTURA, A PRATICARE CANNIBALISMO
IN CASI DI ESTREMA URGENZA

IL CONIGLIO DA COMPAGNIA È GENERALMENTE
AFFETTUOSO E SOCIEVOLE: NONOSTANTE
NON SIANO SOLITI CHIEDERE MANIFESTAZIONI
D' AFFETTO ESPLICITAMENTE, COME POTREBBE
FARE UN CANE, MOLTI CONIGLI HANNO UN
COMPORTAMENTO APERTO E DISPONIBILE.
QUANDO SENTONO L'ESIGENZA DI MANGIARE, NON
È UN CASO CHE VENGANO AI PIEDI DEL PADRONE
A DOMANDARE CIBO, ALZANDOSI SULLE
ZAMPE POSTERIORI




CIRCA 1,5
CHIOGRAMMI



ERBIVORA



IL CONIGLIO NANO
NON ESISTE IN NATURA



4 - 8 ANNI



GESTAZIONE
29 - 32 GIORNI
PICCOLI
DA 2 A 5